

JA西三河・春の除草剤キャンペーン

平素は農協事業につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、見出しの通り除草剤のキャンペーンを行いますので、是非この機会にご利用いただけますようお願いいたします。

平成30年3月15日～5月31日

特別キャンペーン!!

【吸収力が違う!】ラウンドアップ マックスロッド



通常は水10Lあたり100ml希釈の希釈を目安として下さい。

【しっこいスギナ】

5月前後に2.5倍液を散布して、根までしっかり枯らしましょう。
(水10Lあたり400mlの希釈を目安として下さい)

規格	特別価格(税込)	通常価格(税込)
500ml	¥1,690	← ¥1,816
1L	¥3,260	← ¥3,380
2L	¥5,720	← ¥6,037
5.5L	¥9,800	← ¥11,588

【早く枯らすなら!】

パスタ 液剤



【しっこいスギナ】

20～30cm頃(5月,9月)に散布すると、7日ほどで枯らす!
(水10Lあたり100mlの希釈を目安として下さい)

【畦畔除草に最適】

根までは枯らさないで、水稲畦畔や傾斜地の除草に最適!

規格	特別価格(税込)	通常価格(税込)
500ml	¥1,820	← ¥1,911
1L	¥3,340	← ¥3,970
2.2L	¥7,280	← ¥7,754
5L	¥14,800	← ¥15,174

【低コストで枯らすなら】草枯らしMIC



【グリホサート除草剤のジェネリック!】

グリホサートイソピルアミン塩のジェネリック品です。ゆっくり時間をかけて根まで枯らします。ジェネリック品の中でも作物登録が多いのが特徴です。

規格	特別価格(税込)	通常価格(税込)
500ml	¥600	← ¥702
2L	¥2,350	← ¥2,797
5L	¥5,600	← ¥6,782

【素早く枯らし、長く抑える】

ザクサ液剤



素早く雑草を枯らし、枯らした状態を長く保つことができます。雑草の根までは枯らさないで、水田畦畔や傾斜地の除草には最適です。

規格	特別価格(税込)	通常価格(税込)
500ml	¥2,160	← ¥2,270
2L	¥6,380	← ¥6,847
5L	¥15,980	← ¥16,837

【非農耕用除草剤】

商品名	規格	特別価格(税込)
バックアップ粒剤	1kg	¥1,280



【駐車場や空き地】

1～2kg/100㎡をそのまま散布します。今ある草だけでなく、これから生えてくる雑草もしっかり抑えます。枯れ始めるまでに約1ヶ月かかりますが、約4～6ヶ月雑草を抑えます。

※裏面もご覧ください

店頭でのお買い上げのお客様には上記特別キャンペーン価格+粗品(数量限定)を進呈します。

- ★農薬の使用にあたっては、商品ラベルの使用基準をお守りください!
- ★散布の際には、近隣住民への防除の事前連絡を心掛けましょう!

お買い求めは・・・

JA西三河

JA西三河各支店窓口

高平原センター
小牧センター
アグリプラザ欄豆店

TEL 0563-52-3030
TEL 0563-35-0246
TEL 0563-65-0086

ラウンドアップマックスロードと草枯らしMICの違い



農林水産省登録第21766号



農林水産省登録第22449号

ラウンドアップマックスロードは葉からの吸収量、根への移行量が大幅にアップしたため、**吸収移行性、耐雨性、登録作物の数や内容などが従来品より優れています。**また従来品同様、土への高い安全性を持っています。雨に強く散布後1時間たてば、その後雨が降っても問題ありません。温度が低い時、曇った日が続いた時でも確かな効果を持っています。

草枯らしMICはグリホサートイソプロピルアミン塩の**ジェネリック品**です。**吸収移行性、耐雨性、登録作物の数や内容などは劣りますが、雑草が繁茂する夏季に使用する場合は除草効果が上がり、ジェネリック農薬のため価格は安くなっています。**また、安全性は変わりません。

グリホサート除草剤比較表 (日産化学工業、米国モンサント社試験データより)

成分 品名	グリホサートカリウム塩48% ラウンドアップマックスロード	グリホサートイソプロピルアミン塩41% ジェネリック品
温度が低い時の枯殺率(処理21日後) <small>処理時の気温9°Cにて試験草種スズメノテッポウに200倍希釈液を散布試験</small>	95%	70%
乾燥した天気が続いた時の枯殺率(処理10日後) <small>試験草種イチビ(草丈20cm程度)に200倍希釈液散布後、2日間無灌水の試験</small>	100%	50%
曇った日が続いた時の枯殺率(処理後10日後) <small>試験草種イチビ(草丈30cm程度)に処理2日間光量を落とした室内で育成した後100倍希釈液を散布</small>	98%	75%
夕暮れ時の枯殺率(処理10日後) <small>試験草種イチビ(草丈20cm程度)に午後7時に200倍希釈液を散布試験</small>	95%	60%
散布後、雨が降っても良い時間(吸収スピード)	1時間	6時間
登録作物数	50品目程度	40品目程度

バスタとザクサの違い



農林水産省登録第20958号

非選択性の除草剤の中でも多くの作物に登録があり、多くの場面でご使用いただけます。(80作物以上)
散布後2~5日後に効果が出始め、7~14日で枯らします。
発売から31年目を迎え、幅広い雑草に対して効果があります。



農林水産省登録第22901号

ザクサ液剤のようなアミノ酸系の除草剤の製造過程において、従来の製造技術では2つの化合物、L体とD体が混ざった状態で製造されてしまいます。ザクサ液剤は、活性本体であるL体のみ成分として含んでおります。散布後1時間程度降雨がなければ効果に大きな影響はありません。気温や日陰でも高い効果を発揮します。